Anesthésie régionale pour chirurgie de la hanche en 2021

Retour d'expériences

Dr Arnaud ALLUIN

-

*Clinique du sport et de chirurgie orthopédique de Marcq-en-
Barœul*

Aucun conflits d'intérêts en rapport avec cette présentation

aea. De quoi parle-t-on ?

Chirurgie programmée

(150 000 PTH/ an)

Urgence traumatologique (15% mortalité à 6 mois)

Population âgée

→ Intérêt majeur de l'ALR

« *Se préparer c'est déjà commencer* »

1

Quelle chirurgie ?

> Quels contingents anatomiques ?

2

Quelles attentes de l'ALR ?

> Analgésique
ou
> Anesthésique ?

3

Quel délai avant mobilisation ?

> Motor-sparing block
> RAAC
> Alitement prolongé,
absence d'appui

Quels contingents dois-je cibler ?

Une zone anatomique à la croisée des chemins

Division postérieure
 Division antérieure

**Plexus lombaire =
face antérieure**

**Plexus sacré =
face postérieure**

Branches hautes et branches basses

Articular branch of the obturator nerve

Obturator nerve

Okada, K. Pain Res 8: 125–135, 1993

Articular branch of the superior gluteal nerve

Branch of the musculus quadratus femoris

➔ Efficacité inconstante du bloc « 3 en 1 »

Ostéotomes

J Gadsen et al, Local and Regional Anesthesia 2015

Short AJ et al. RAPM, 2018

Implications de ces mises à jour
anatomiques?

Pericapsular Nerve Group (PENG) Block for hip analgesia.

A report of three cases

Laura Girón Arango, MD, Philip Peng, MBBS, FRCPC, Founder (Pain Medicine), Richard Brull, MD, FRCPC, Anahi Perlas, MD, FRCPC
Department of Anesthesia, Toronto Western Hospital, University of Toronto, Toronto, ON

Introduction

Hip Fracture is a common orthopedic emergency in elderly people and is associated with moderate to severe pain.¹ The pain pathway from the hip joint originates from the articular branches of the femoral nerve (FN), the obturator nerve (ON) and the accessory obturator nerve (AON).^{2,3} The articular branches of the FN and AON provide most of the innervation to the lateral and supero-medial hip capsule and course deep to the iliopsoas muscle between the anterior inferior iliac spine and iliopectineal eminence. Fascia iliaca block (FIB) and Femoral nerve blocks are commonly used for analgesia in hip fracture patients. However, they only provide a modest reduction in pain and opioid consumption.⁴ These blocks are neither proximal nor deep enough to cover the articular branches consistently. Real-time ultrasound can identify the plane where the Femoral and AON articular branches are located.

Materials and Methods

A curvilinear low-frequency ultrasound probe (e.g. 3-5 MHz) is placed in a transverse plane over the anterior inferior iliac spine and then aligned with the pubic ramus by rotating the probe counter-clockwise about 45 degrees (Figure 1). In this view, the iliopsoas muscle and tendon, the femoral artery and pectineus muscle are observed. An 80mm, 22 Gauge needle is inserted from lateral to medial in plane with the ultrasound beam (Figure 2). Following negative aspiration, 20 mL of Bupivacaine 0.25% with epinephrine 1:400,000 are injected in the plane between the iliopsoas tendon and the pubic ramus.

Written consent was obtained from the patients for publication.

FIGURE 1. PENG block - Patient leg, needle and transducer positions

Results

The PENG block was performed in three patients with hip fractures. Demographic data is shown in Table 1. Dynamic pain was assessed before and 30 minutes after block placement (Graphic 1). The three patients reported significant improvement in dynamic pain 30 minutes after the block.

Table 1: Demographic data

	Patient 1	Patient 2	Patient 3
Gender	F	F	M
Age	70	80	68
ASA	III	III	IV
Side	L	L	R
Hip pathology	Intertrochanteric fracture	Subcapital fracture	Metastatic tumor femoral head acetabulum

IPE: Iliopubic eminence, AIS: Antero-inferior iliac spine, PR: Pubic Ramus, IT: Iliopsoas tendon
Red dotted line: needle trajectory

Discussion

These three cases suggest promising results with a new site of local anesthetic administration for hip fracture analgesia. Larger studies need to be conducted to compare the efficacy of this new technique with that of the more established FIB.

- 1. Morrison RS, Magaziner J, McLaughlin MA, Orosz G, Silberzweig SB, Koval KJ, et al. The impact of post-operative pain on outcomes following hip fracture. *Pain*. 2003 Jun;103(3):303-11.
- 2. Short AJ, Barnett JGG, Gofeld M, Baig E, Lam K, Agur AMR, et al. Anatomic Study of Innervation of the Anterior Hip Capsule: Implication for Image-Guided Intervention. *Reg Anesth Pain Med*. 2018; 43 page XXX.
- 3. Gerhardt M, Johnson K, Atkinson R, Snow B, Shaw C, Brown A, et al. Characterisation and classification of the neural anatomy in the human hip joint. *Hip Int*. 2012 Feb;22(1):75-81.
- 4. Guay J, Parker MJ, Griffiths R, Kopp S. Peripheral nerve blocks for hip fractures. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 11;5:CD001159.

aea. Effet volume sur l'obturateur?

Reg Anesth Pain Med 2019;44:257.

Technique du Dr PENG

- Injection sous le tendon du spoas
- En regard de l'éminence ilio-pubienne

Obturator nerve block does not provide analgesic benefits in total hip arthroplasty under multimodal analgesic regimen: a randomized controlled trial

Philippe Marty¹, Clement Chassery¹, Olivier Rontes¹, Corine Vuillaume¹, Bertrand Basset¹, Mehdi Me...
 Constance Marquis¹, Anne Delussy¹, Marie-Claude Delbos¹, Fabrice Ferre², Benoit Bataille³, Giris...
 Delbos¹

Correspondence to Dr Philippe Marty, Department of Anesthesia, Clinique Medipole Garonne, Toulouse, Occitanie, Fr...
philippemarty@hotmail.com

Table 2
 Opioid consumption in the two groups

	Obturator NB group (n=30)	Placebo group (n=30)	P value*†
No need for opioid during surgery, n (%)	28 (93)	29 (97)	1
Median intraoperative sufentanil (IQR) (µg)	0 (0, 0)	0 (0, 0)	0.78
No need for opioid in the PACU, n (%)	7 (23)	12 (40)	0.16
Median intravenous oxycodone consumption in PACU (IQR) (mg)	4 (2, 7.5)	3 (0, 4)	0.05
No need for opioid in the surgical ward, n (%)	23 (77)	23 (77)	1
Median oral oxycodone consumption in the surgical ward (IQR) (mg)	0 (0, 0)	0 (0, 0)	0.96

An Obturator Nerve Block does not Alleviate Postoperative Pain after Total Hip Arthroplasty: a Randomized Clinical Trial

te Runge,¹ Louise Clemmesen,¹ Jens Børglum,⁴
 ghed Larsen,^{1,2} Thomas Dahl Nielsen,³
 ndtsen^{2,3}

Le bloc obturateur à nouveau OUI pour la PTH

Dans le cadre de l'urgence: *Soulager!*

Review > Can J Anaesth. 2013 Mar;60(3):230-
Epub 2013 Jan 19.

Efficacy of supplemental p for hip fracture surgery: m comparison

Saifee Rashaq¹, Ben Vandermeer, Ahmed M Abou-
Dryden

R8.1 – Il ne faut probablement pas infiltrer en intra-articulaires et/ou en sous-cutané avec des anesthésiques locaux en cas de chirurgie après fracture du col fémoral ou/et d'arthroplastie de hanche.

GRADE 2– (ACCORD FORT)

doi: 10.7326/0003-4819-155-4-201108160-00346.

Assessment of pain management for hip fracture: a systematic review

Saifee Rashaq, Donna M Dryden, Michele P Hamm, Cheryl
Ajumdar, Donna M Wilson, Mohammad
Ajumdar, C Allyson Jones

R8.2 – Il faut probablement réaliser un bloc fémoral ou iliofascial pour assurer l'analgésie en cas de FESF.

GRADE 2+ (ACCORD FORT)

Personne âgée alitée

**Bloc ilio-fascial ou Fémoral + Obturateur précoce !
Equipe mobile d'ALR antalgique aux urgences ?!**

ALR anesthésique + (/-) sédation

Rachianesthésie +++

« coût » hémodynamique parfois

Impossibilité technique

Bloc du plexus lombaire + bloc sciatique para-sacré

Bloc (ilio-)fémoral (+ bloc du nerf cutané latéral de cuisse) + bloc du nerf obturateur sous-pectinéal + bloc sciatique +/- bloc du carré des lombes

Impact of multiple nerves blocks anaesthesia on intraoperative hypotension and mortality in hip fracture surgery intermediate-risk elderly patients: A propensity score-matched comparison with spinal and general anaesthesia

Benjamin Mounet^a, Olivier Choquet^a, Fabien Swisser^a, Philippe Biboulet^a, Nathalie Bernard^a, Sophie Bringuier^{a,b}, Xavier Capdevila^{a,c,*}

^a Department of Anaesthesiology and Critical Care Medicine, Lapeyronie University Hospital, 34295 Montpellier Cedex 5, France

^b Department of Medical Statistics, and Epidemiology, Montpellier University Hospital, 34295 Montpellier Cedex 5, France

^c Inserm Unit 1298 Montpellier NeuroSciences Institute, Montpellier University, 34295 Montpellier Cedex 5, France

* $p < 0.05$ between GA group and both RA groups

Fig. 2. Percentages of patients in the three groups with hypotension episodes, those < 50 mmHg and patients receiving vasopressors.

Des fesses et des hommes

NADIELLE KUTLU
COLLABORATION SPÉCIALE

Les hommes sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la chirurgie esthétique. Malgré tout, le sujet reste encore tabou. L'opération qui devient de plus en plus populaire ? L'augmentation

Six trucs pour mettre en valeur son postérieur, selon Emilie Lambert, styliste pour Les Effrontés

Ps

Sciatique à la fesse! (para-sacré)

→ **Seul intérêt dans le bloc anesthésique !**

- 1: sciatic nerve
- 2: posterior border of ischium
- 3: obturator internus
- 4: gluteus minimus
- 5: skin, subcutaneous
- 6: gluteus maximus
- 7: piriformis
- 8: parasacral area
- 9: ureter
- 10: rectum

aea.

Groupe francophone
de Réhabilitation
Améliorée après Chirurgie

Analgésie
et épargne
motrice

LIA, grand succès depuis 2008 (Kerr)

- L'infiltration est divisée en 3 injections de volume équivalent (50 à 70 ml).
- Très (trop) grande hétérogénéité des pratiques

>> Intérêt dans la mobilisation précoce

La mobilisation relève d'une prise en charge « pro-active » de l'ensemble de l'équipe soignante, les BNP ne la retardent pas!

Posterior Quadratus Lumborum Block in Total Hip Arthroplasty

A Randomized Controlled Trial

Sophia Margareta Brixel, M.D., Philippe Biboulet, M.D., Fabien Swisser, M.D., Olivier Choquet, M.D., Yassir Aarab, M.D., Helen Nguyen, M.D., Sophie Bringuier, Pharm.D., Ph.D., Xavier Capdevila, M.D., Ph.D.

Anesthesiology 2021; 134:722–33

■ CASE REPORT

Quadratus Lumborum Block as an Alternative to Lumbar Plexus Block for Hip Surgery: A Report of 2 Cases

Luca La Colla, MD, Bruce Ben-David, MD, and Rita Merman, MD

“...neither morphine consumption nor pain scores were reduced by the addition of a posterior quadratus lumborum block to a ***multimodal analgesia*** regimen”

Ultrasound-guided quadratus lumborum block for postoperative analgesia: A systematic review and meta-analysis

Andrus Korgvee¹, Eija Junttila, Heikki Koskinen, Heini Huhtala, Maija-Liisa Kalliomaki

- 27 études, 1557 patients, viscéral et chirurgie de hanche
- Moindre consommation morphiniques
- Temps prolongé avant le morphinique de secours.
- Moindre NVPO

QLB est une option possible en analgésie de la hanche

Quadratus Lumborum and modified Erector Spinae Plane (QLESP) block: A single-puncture technique for total hip arthroplasty

Xi Wu ¹, Lei Yang ²

Comparison of Ultrasound-Guided Lumbar Erector Spinae Plane Block and Transmuscular Quadratus Lumborum Block for Postoperative Analgesia in Hip and Proximal Femur Surgery: A Prospective Randomized Feasibility Study

Serkan Tulgar ¹, Halil Cihan Kose ², Onur Selvi ¹, Ozgur Senturk ¹, David Terence Thomas ³, Mehmet Nurullah Ermis ⁴, Zeliha Ozer ¹

Combination of Lumbar Erector Spinae Plane Block (LESP) and Pericapsular Nerve Group (PENG) block in hip surgery

Ilker Ince ¹, Alper Kilicaslan ²

Table 2 Studyou

Postoperative pai
0–12 h
12–24 h
24–48 h
Postoperative opi
Yes
No
Time to first opioi
Total opioid cons
Safety table

Randomized comparison between pericapsular nerve group (PENG) block and suprainguinal fascia iliaca block for total hip arthroplasty

Julián Aliste ,¹ Sebastián Layera ,¹ Daniela Bravo ,¹ Álvaro Jara,¹ Gonzalo Muñoz,¹ Cristián Barrientos,² Rodrigo Wulf,² Julián Brañez,² Roderick J Finlayson ,³ De Q Tran ⁴

Aliste J, et al. *Reg Anesth Pain Med* 2021;0:1–5. doi:10.1136/rapm-2021-102997

Table 2 Sensory and motor block assessment

Motor block	SIFIB (n=20)			PENG (n=20)			
	No block	Paresis	Paralysis	No block	Paresis	Paralysis	
Knee extension at 3-hour postblock, n (%)	2 (10)	4 (20)	14 (70)	11 (55)	7 (35)	2 (10)	<0.001
Knee extension at 6-hour postblock, n (%)	3 (15)	6 (30)	11 (55)	15 (75)	4 (20)	1 (5)	<0.001
Knee extension at 24-hour postblock, n (%)	13 (65)	5 (25)	2 (10)	19 (95)	1 (5)	0 (0)	0.102
Hip adduction at 3-hour postblock, n (%)	2 (10)	10 (50)	8 (40)	10 (50)	8 (40)	4 (20)	0.023
Hip adduction at 6-hour postblock, n (%)	7 (35)	8 (40)	5 (25)	10 (50)	7 (35)	3 (15)	0.341
Hip adduction at 24-hour postblock, n (%)	14 (70)	5 (25)	1 (5)	15 (75)	5 (25)	0 (0)	0.738

PENG Block

Analgesia and anesthesia using the pericapsular nerve group block in hip surgery and hip fracture: a scoping review

Craig Morrison ,¹ Brigid Brown,¹ D-Yin Lin,¹ Ruurd Jaarsma,² Hidde Kroon^{3,4}

- Véritable *bloc à épargne motrice, épargne morphinique modeste*
- *Logique intéressante dans un protocole RAAC*
- +/- associé à bloc du nerf CLC (voie antérieure)

R3.1 – Il n'est probablement pas recommandé de réaliser systématiquement une ALR périnerveuse (bloc fémoral, bloc ilio-fascial ou bloc du plexus lombaire par voie postérieure) pour le contrôle de la douleur postopératoire en chirurgie programmée de la hanche.

(GRADE 2–) ACCORD FORT

Pas d'influence de la voie d'abord pour la déambulation précoce

Voie d'abord postérieure de la hanche selon Moore

Question 13 : Le choix d'une technique d'analgésie en postopératoire d'arthroplastie du membre inférieur permet-elle de réduire la durée de séjour ou la survenue de complications ?

Experts : Sébastien Bloc, Julien Cabaton

R10.1 – Il est probablement recommandé d'appliquer une stratégie d'épargne morphinique en postopératoire d'arthroplastie de hanche et de genou pour réduire la durée de séjour et les complications digestives et respiratoires postopératoires.

GRADE 2+ (accord FORT)

Argumentaire : Les RFE de la SFAR concernant la prise en charge de la douleur postopératoire, mettent en avant l'intérêt de l'analgésie multimodale pour la prise en charge de la douleur postopératoire [1]. Dans une étude rétrospective récente [2], il est montré que sur plus de 1,5 millions de patients, le fait de ne pas utiliser de morphinique... Deux études rétrospectives sur le genou avaient déjà montré...

Question 17 : Le lever précoce (avant la 24e heure postopératoire) après arthroplastie du membre inférieur permet-il de diminuer la durée de séjour ou la survenue de complications ?

Expert : Pascal Alfonsi

R14 – Il est probablement recommandé de lever les patients opérés d'une arthroplastie de hanche ou de genou dans les 24 premières heures postopératoires pour réduire la durée moyenne de séjour.

Question 18 : La rééducation précoce (intervention d'un masseur kinésithérapeute) en postopératoire d'arthroplastie du membre inférieur permet-elle de réduire la durée de séjour ou la survenue de complications ?

Expert : Stéphane Fabri

R15 – Une rééducation précoce est probablement recommandée après arthroplastie de hanche et de genou pour réduire la durée moyenne de séjour.

R10.2 – Il est recommandé d'utiliser des techniques d'analgésie locale et/ou loco-régionale pour diminuer la douleur et la consommation de morphiniques en postopératoire d'arthroplastie de genou.

GRADE 1+ (accord FORT)

ABSENCE DE RECOMMANDATION – Les données actuellement disponibles dans la littérature sont insuffisantes pour que les experts émettent une recommandation sur l'intérêt de l'analgésie locale ou locorégionale pour diminuer la douleur et/ou la consommation d'opiacés en postopératoire d'arthroplastie de hanche dans un programme de réhabilitation.

NO MAGIC BULLET

**PEC à la carte
MULTIMODALE +++**

**chirurgie traumatologique
et au sujet âgé**

> Rachianesthésie

Si pas de déambulation

- Fémoral + obtu sous-pectinéal +/- CLC
- Plexus lombaire +/- sciatique para-sacré (si AG ou RA contre-indiqué)

Si déambulation

- PENG +/- CLC
- +/- Obturateur sous-pectinéal
- ou infiltration

Radiofrequency Procedures to Relieve Chronic Hip Pain *An Evidence-Based Narrative Review*

Anuj Bhatia, MD, MBBS, FRCA, FRCPC (Anesthesia & Pain Medicine), FIPP, FFPMRCA, EDRA, CIPS, *†‡
Yasmine Hoydonckx, MD, FIPP,*‡ Philip Peng, MBBS FRCP, Founder (Pain Medicine), *‡
and Steven P. Cohen, MD§||

> J Clin Anesth. 2020 Apr 27;64:109830. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.109830. Online ahead of print.

Percutaneous bipolar radiofrequency of the pericapsular nerve group (PENG) for chronic pain relief in hip osteoarthritis

Santiago Jaramillo ¹, David Muñoz ¹, Sergio Orozco ¹, Ana Milena Herrera ²